

هموروئید یا بواسیر:

هموروئیدیا بواسیر بیماری مزمن و شایعی است که اکثر انسان های بالغ در دوره ای از زندگی به آن دچار می شوند. این عارضه با خارش و احساس ناراحتی و شاید خونریزی همراه است. هموروئیدیا بواسیر عبارت است از سیاه رگ های گشاد شده و واریسی در مقعد که ممکن است در مجرای مقعدی که آن را بواسیر داخلیا خارجی می نامند ایجاد شود. این عارضه می تواند به هنگام دفع مدفوع در ناراحتی و گاهی خونریزی به همراه داشته باشد.

درمان هموروئید یا بواسیر با روش پروکتوسکوپی

هموروئید می تواند درجات و انواع مختلفی داشته باشد. برای تشخیص و درمان قطعی از روش های متعددی استفاده می شود. یکی از این روش ها پروکتوسکوپی است که طی آن راست روده و قسمت انتهای روده با وسیله ای به نام پروکتوسکوپ بررسی و معاینه می شود. پروکتوسکوپ وسیله ای اپتیک است که سر آن دارای منبع نورانی است. به دنبال این معاینه با چند خراش کوچک در اطراف ناحیه هموروئید می توان آن را درمان کرد. این روش درمانی بدون بیهوشی انجام می پذیرد و بیمار پس از ۲ یا ۳ روز می تواند به زندگی

روزمره و عادی خود ادامه دهد.

علت های شایع بروز هموروئید یا بواسیر

- * رژیم غذایی کم فیبر
- * یبوست مزمن
- * استرس و فشارهای عصبی
- * بالا رفتن فشار خون در سیستم گوارشی (در اثر اعتیاد به الکل)
- * عارضه های کبدی (مانند سیروز کبدی)

انواع هموروئید یا بواسیر

*** هموروئید خارجی:** در این حالت هموروئید از درون روده متورم می شود و بیمار درد و ناراحتی بسیاری دارد و در هنگام دفع مدفوع منجر به خونریزی می گردد.

*** هموروئید داخلی:** این نوع هموروئیدیا بواسیر در زیر پوست کنار مقعد ایجاد می شود. در این نوع بواسیریا هموروئید بسیار حساس تر است و بیمار احساس درد و خارش بیشتری دارد.

* هموروئید ترومپوز :

این نوع بسیار دردناک تر است و بیمار هر چند ساعت یکبار با علائم بواسیریا هموروئید روبرو می شود.

علائم و نشانه های بروز هموروئید یا بواسیر

- * خونریزی
- * درد
- * خارش
- * التهاب در ناحیه مقعد

منظور از حمام Sitz یا استحمام نشیمن:

حمام گرم و کم عمقی است که ناحیه رکتوم و پرینه (میان دو راه) را پاکیزه می سازد و درد و خارش ناحیه تناسلی را تسکین می دهد. برای ساخت حمام Sitz می توانید از لوله آب گرم یا لگن مخصوص که بر روی توالت های فرنگی نصب می شود، استفاده نمایید.

• این حمام باعث افزایش گردش خون در ناحیه رکتوم شده و بهبودی را سریع تر می کند اما افراد سالم نیز می توانند از آن استفاده نمایند.

چه کسانی باید از حمام Sitz استفاده کنند؟

- * خانم هایی که به که به تازگی زایمان کرده اند.
- * افرادی که به تازگی جراحی تناسلی داشته اند (مثل جراحی واژن)



دانشگاه علوم پزشکی شیراز
بیمارستان جواد الائمه (ع)
شهرستان خرامه

هموروئید یا بواسیر	عنوان:
فاطمه زارعی کارشناس پرستاری	تهیه کننده:
بهار ۱۴۰۵	سال تهیه:
برونر سودرات ۲۰۲۶	منبع:
دکتر شکراله سپهر تاج متخصص جراحی عمومی	تأیید کننده:

هرگز با خشونت این کار را انجام ندهید زیرا این احتمال وجود دارد که پوست ناحیه مقعد تحریک شده و خارش ایجاد گردد. سپس لگن را خالی نموده و خشک کنید تا برای استفاده‌های بعدی آماده باشد. استفاده از این حمام تا ۳ الی ۴ بار در طول روز توصیه شده است.

* در حال حاضر حمامsitz دارای انواع مختلفی است که رایج ترین آن بر روی توالت فرنگی قرار می‌گیرد، نوعی پیشرفته این حمام متصل به شلنگ است و به راحتی از آب پر میشود.

* تاثیر حمامsitz بر روی بیماریهای مقعی
* استفاده از حمامsitz یکی از راهکارهای مکمل درمان است.



* افراد مبتلا به ناراحتی های روده

* افراد مبتلا به پرولاپس رکتوم

* افراد مبتلا به پروست

* افراد مبتلا به زخم های تناسلی و

عفونت مهبل

نحوه استفاده از حمامsitz

* در ابتدا لگن مورد نظر را با استفاده از مواد ضد عفونی کننده تمیز کرده و بعد ظرف را با آب گرم پر نمایید، میزان گرمی آب نباید به حدی باشد که پوست بسوزد. از قبل حوله خود را در دسترس قرار دهید و پس از اضافه نمودن مواد دلخواه به آب، برای مدت ۱۵ الی ۲۰ دقیقه در این آب گرم بنشینید. پس از طی این مدت از حمام خارج شوید و با استفاده از یک حوله نرم به آرامی ناحیه مقعد را خشک کنید.