

قابل توجه بیماران محترم

آزمایشات:

در شروع دیالیز از شما آزمایش آنتی ژن و آنتی بادی گرفته می شود که شامل:

❖ هپاتیت ب، تیتتر هپاتیت ب، هپاتیت سیو ایدز می باشد
آزمایش هپاتیت ب شش ماه و ایدز، هپاتیت سی، تیتتر هپاتیت ب تا یک سال اعتبار دارد .

در صورتی که آنتن ژن شما منفی باشد می توانید در این مرکز تحت همودیالیز قرار بگیرید

آزمایشات ماهیانه:

uric, Fbs, cbc , P. CA, K, Na, cr, Bun, acid,

سه ماه یکبار:

فرتین، آزمایشات کبدی، چربی خون، Tibc, Iron,

شش ماه یکبار:

HbsAg, ALT, AST

سالانه :

ایدز، هپاتیت سی ویتامین دی

❖ بیماران محترم در بدو پذیرش باید گزارش آخرین سونوگرافی از کلیه ها و مثانه، تراکم استخوان، مشاوره قلب خود را به پرستار بخش جهت ثبت و نگهداری در پرونده تحویل فرمایید.

❖ در صورتی که آنتی بادی هپاتیتی شما زیر ۱۰ باشد باید واکسن هپاتیت تزریق کنید که طبق دستور پزشک در چهار نوبت با دوز دو برابر افراد عادی واکسن میزنیمیک ماه بعد از آخرین نوبت واکسن دوباره آزمایش آنتی بادی چک میشود اگر آنتی بادی بالای ۱۰ باشد نیاز به واکسیناسیون مجدد نیست ولی اگر زیر ده بوده باید دوباره واکسیناسیون تکرار شود.

❖ واکسن آنفلانزا

در شهریورماه واکسن آنفلانزا تزریق کنید تا در طول پاییز و زمستان بدنتان در مقابل سرماخوردگی ایمن بماند .

❖ واکسن پنوموکوک:

هر ۳ تا ۵ سال میتوانید جهت پیشگیری از عفونت پنوموکوک پنومونیای عفونت ریه تزریق کنید.

❖ اول هر ماه دفترچه بیمه و کپی از صفحه اول دفترچه خود را به بخش تحویل دهید همیشه تاریخ اعتبار دفترچه خود را در نظر داشته باشید.

❖ در صورتی که قصد مسافرت دارید حتماً با مرکز دیالیز شهر مقصد جهت گرفتن نوبت هماهنگ کنید و سپس اقدام به سفر نمایید قبل از رفتن به سفر از مسئول بخش برگه معرفی نامه و جواب آزمایش آنتی ژن را جهت



دانشگاه علوم پزشکی شیراز

بیمارستان جوادالائمه (ع)



عنوان	راهنمای بیماران جدید دیالیزی
تهیه کننده	مهسا زارعی کارشناس پرستاری
سال تهیه	بهار ۱۴۰۱
تائید کننده	دکتر فاطمه گریست متخصص داخلی
منبع	گروه نویسندگان پرستار و دیالیز و وزارت بهداشت و درمان پزشکی ۱۳۸۹

تحويل به مرکز دیالیز مقصد بگیرید از برگه جواب آنتی

ژن کپی بگیرید و اصل آن را با خود ببرید.

❖ قبل از وارد شدن به بخش با لباس و دمپایی مخصوص

بخش وارد بخش شوید.

❖ در هنگام وصل شدن به دستگاه و هنگام جدا شدن از

دستگاه حتماً از ماسک استفاده نمایید.

❖ بهتر است در حین دیالیز از خوردن مواد غذایی خود

داری کنید تا دچار عوارض حین دیالیز نشوید.