



دانشگاه علوم پزشکی شیراز

بیمارستان جوادالائمه (ع)

مسمومیت با ضد افسردگی ها

تهیه کننده	زهرا نجفی کارشناس پرستاری
تأیید کننده	دکتر مریم عبدالله پور متخصص طب اورژانس
سال تهیه	تابستان ۱۴۰۳
منبع	کتاب اورژانس های داخلی و اطلاعات دارویی ایران . بهنام ثبوتی و مهدی موسوی و افشین امینی

تپش قلب یکی از نشانه های احتمال تشنج میباشد که باید به آن توجه شود و توسط پرستار به همراه آموزش داده شود .

بیماری که دست به اقدام مصرف بیش از حد داروهای ضد افسردگی میزند حتما بعد از بهبودی علایم حیاتی و هوشیاری کامل باید توسط روانشناس و روانپزشک ویزیت شود و علت این کار بررسی گردد

بعد از شروع رژیم غذایی باید مایعات فراوان مصرف گردد جهت خروج سریعتر داروها از بدن و برگشت عملکرد کلیه ها و کبد .

ممکن است در اثر مسمومیت با این دارو خشکی دهان اتفاق بیفتد لذا نیاز است از اینباتهای ترش و مایعات خنک بیشتر استفاده شود مکیدن تکه های یخ هم توصیه میشود

بعلت بروز یبوست توصیه میشود میوه هایی با فیبر بالا مثل انجیر و الو زیاد استفاده شود .

مسمومیت با ضد افسردگی ها



بیشترین مسمومیت در افراد جوان و با داروی امی تریپتالین رخ میدهد

حداکثر زمان بروز علائم مسمومیت در ضد افسردگی ها در عرض ۲ الی ۶ ساعت ایجاد میشود .

علائم مسمومیت با ضد افسردگی ها :

شامل افت فشار خون و تپش قلب و تشنج و افزایش درجه حرارت بدن و افت سطح هوشیاری میباشد .

اقدامات درمانی عبارت اند از :

به هیچ وجه چیزی را از راه دهان نخورد .